


Description spécifique et Nomenclature des variétés les plus remarquables de ce Rosier.

R. BIFERA.

R. *germinibus infundibuliformibus pedunculisque hirsuto-glandulosis; foliolis margine pubescentibus eglandulosis; caule aculeis sparsis recurvis; floribus* 3-4 *subcorymbosis.* (N.)

R. *Bifera.* Du P. Choix des Roses, etc., p. 4. — Deleuze dans l'Hist. des arbres et arbrisseaux de Desf. 2, p. 163. Nouv. Duham. vol. 7, p. 32, var. 1, 2, 3. *aliis excl.*

R. (*Semper florens.*) *Hortus Par.* D C. Fl. franc., 3706, *non* Willd. *non* Curtis.

Les Rosiers de ce groupe sont séparés de tous les autres par les tubes de leur calice infundibuliformes : ils s'éloignent du Rosier à cent feuilles non-seulement par ce dernier caractère, mais encore par leurs fleurs le plus souvent rapprochées en corymbe, leurs aiguillons plus recourbés, et leurs folioles dépourvues de poils glanduleux en leurs bords.

α. R. *Bifera vulgaris, floribus corymbosis strictis.* (N).
R. *Bifera semper florens.* Nouv. Duham. *l. c.* var. 1.
R. (*Calendarum*) *corymbosa.* Roess. *Beschrei. der R.* 1, p. 132.
R. (*Menstrua.*) Andr. R. fig.

Pédoncules courts, redressés, très-rapprochés : fleurs semi-doubles de couleur rose, très-odorantes, disposées en une espèce de corymbe. Vulg. *le Rosier des Quatre saisons*, le *Bouquet tout fait, le Rosier de tous les mois, de deux fois l'an*, etc.

β. R. *Bifera alba.* Du P. *l. c.* p. 14.
R. *Bifera Candida*, Nouv. Duham. *l. c.* p. 33, var. 2.
R. (*Damascena*), var. ε. Ait. Kew. 2, p. 205 (*White monthly Rose*). Miss Law. Tab. 17. Vulg. *la Quatre saisons à fleurs blanches.* Fleurs érigées en une espèce de corymbe, comme dans la précédente.

γ. R. *Bifera officinalis* (*floribus sub flaccidis*). Du P. *l. c.* p. 4.
R. *Bifera myropolarum*, Nouv. Duham. *l. c.* var. 3. Vulg. *le Rosier de Puteaux, le Rosier des Parfumeurs.*

δ. R. *Bifera aurantia.* Charp. Semis de Rosiers, etc., p. 1, n° 1. Ce Rosier diffère de la variété α. par ses fleurs d'un plus grand diamètre et ses pétales roses lavés d'une teinte citrine. Elle a été obtenue de semis dans la pépinière du jardin du Luxembourg, où elle a reçu le nom de Rose Semonville.

Tous ces Rosiers produisent des fleurs très-odorantes. Les vieux pieds de la variété α. fleurissent toute l'année, ainsi que nous l'avons observé sur des individus qu'on cultive depuis long-temps dans les plates-bandes du jardin des Tuileries. Les autres variétés ne portent en général des fleurs que deux fois l'an dans les jardins, d'où vient le nom de *Bifera* que leur a imposé M. Du Pont. Voyez *Nouvelles observations sur le jardinage*, ouvrage traduit de l'anglais, de Bradley (Paris, 1756.) t. 1, p. 193.